

Deze tabellenbrochure is geldig
voor het jaar 2023

(Versie 31-05-2023)
(Bron [RVO](#))

Tabel 1

Wanneer mest uitrijden

Voor dierlijke mest en zuiveringsslib zijn er verschillende uitrijperiodes. Bepalend voor die verschillen zijn de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. U mag niet uitrijden als de bodem bevroren, besneeuwd of met water verzadigd is. Ook mag u geen mest gebruiken als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.

Zuiveringsslib met niet meer dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof mag u onder voorwaarden het hele jaar gebruiken. Meer informatie vindt u op onze website. Op onze website vindt u ook de uitrijregels voor compost, overige organische mest, EG-mest, overige anorganische mest en kalkmestsoorten.

| | Grasland | | | | Bouwland | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib | | Vaste mest en steekvast zuiveringsslib | | Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib | | Vaste mest en steekvast zuiveringsslib | |
| | Zand- en lössgrond | Klei- en veengrond | Zand- en lössgrond | Klei- en veengrond | Zand- en lössgrond | Klei- en veengrond | Zand- en lössgrond | Klei- en veengrond |
| januari | | | **** | *** | | | * / **** | |
| februari | | | | | | | | |
| maart | | | | | ***** | ***** | | |
| april | | | | | | | | |
| mei | | | | | | | | |
| juni | | | | | | | | |
| juli | | | | | | | | |
| augustus | | | | | ** | ** | | |
| september | | | | | ** | ** | * | |
| oktober | | | | | | | * | |
| november | | | | | | | * | |
| december | | | | *** | | | * | |

Uitrijden verboden
 Uitrijden toegestaan

* Bij de aanplant van plantsoen- en fruitbomen mag u vaste dierlijke mest en steekvast zuiveringsslib op bouwland op zand- en lössgrond het hele jaar gebruiken.

** Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland mag u op alle grondsoorten van 1 augustus tot en met 15 september uitrijden als:

- u uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar of;
- u uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait of plant die minimaal 8 weken blijft staan voordat het vernietigd wordt of;
- u in het aansluitende najaar bollen plant.

*** Rijdt u vaste storrijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag u uitrijden van 1 december tot en met 15 september.

**** Rijdt u vaste storrijke mest uit op grasland of bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus.

***** Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u uitrijden vanaf 16 februari. U meldt dit via Mijn percelen. De lijst met vroege gewassen vindt u op Wanneer mest uitrijden (rvo.nl).

Tabel 2

Stikstof landbouwgrond

Waarvoor gebruiken?

U gebruikt de forfaits (wettelijke normen) in dit document bij het berekenen van uw stikstofgebruiksruimte. Dit is de hoeveelheid stikstof uit alle soorten mest, die u mag gebruiken op uw bedrijf.

Hoe gebruiken?

Elk gewas of gewasgroep heeft per grondsoort een norm. U rekent met deze normen uit hoeveel stikstof u mag gebruiken voor elk gewas dat u teelt, en telt dit bij elkaar op. De uitkomst is uw stikstofgebruiksruimte.

De som die u maakt voor elk gewas ziet er zo uit:

$$\frac{\text{aantal hectare landbouwgrond van het gewas op 15 mei}}{\text{norm van het gewas en grondsoort}}$$

Normen voor volgteelt

Teelt u na de eerste teelt (het gewas dat u teelt op 15 mei) een ander gewas? Dan rekent u voor elke volgteelt nog een keer de norm van dat gewas. Staat in de tabel een aparte norm voor een volgteelt? Dan gebruikt u die voor elke volgteelt.

Dit geldt niet voor gewassen waar 'meermalige oogst' is vermeld. Voor deze gewassen geldt de norm het hele jaar en niet voor elke teelt.

Voor sommige gewassen telt u de norm mee in het jaar van oogsten. Dit zijn wintertarwe, wintergerst, tricale, winterrogge en haver (de gewassen met voetnoot 5).

Volgteelt na maïs

Teelt u na maïs een groenbemester, tijdelijk grasland of een verplicht vanggewas? Dan mag u voor deze volgteelt geen extra norm rekenen (zie voetnoot 2 en 6, en tabel 3).

Beweiden of volledig maaïen?

U bepaalt in 1x voor uw hele bedrijf of uw grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaïen.

Onder grasland met volledig maaïen valt ook grasland, waarop u jongvee weidt van runderen niet ouder dan twee jaar. Het aantal stuks jongvee in de wei is kleiner dan het aantal ouderdieren op uw bedrijf. U mag er ook hobbydieren op weiden.

Winterteelt

Voor gewassen met 'winterteelt' mag u de hele norm in het jaar van inzaai, planten of poten gebruiken. Gebruikt u een deel van de norm in het tweede jaar? Dan is dat maximaal de hoeveelheid die staat bij 'waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)'.

Mengteelt en onderzaai

Bij mengteelt gebruikt u de norm van het gewas dat de meeste winst oplevert. Bij onderzaai gebruikt u de norm van het hoofdgewas. Kunt u na de oogst van het hoofdgewas het ondergewas oogsten? Dan mag u ook voor dit ondergewas de norm meetellen.

Graszaad

Teelt u graszaad en krijgt u in het voorjaar of najaar nog een voedersnede? Dan kunt u het perceel in deze periodes als grasland zien. U rekent naast de norm voor graszaad ook met de norm voor tijdelijk grasland.

Aardappelrassen hoge of lage norm

Voor aardappelrassen is er een hoge of lage norm. Welke u gebruikt hangt af van uw aardappelras. De overzichten van aardappelrassen staan in tabel 2c en 2d. Staat uw aardappelras niet in deze overzichten? Dan gebruikt u de norm voor 'consumptieaardappelrassen overig' of 'pootaardappelrassen overig'. De normen staan op de volgende pagina.

Fritesaardappelen op klei

Voor fritesaardappelen uit tabel 2a die u teelt op klei zijn er hogere normen. Die horen bij de regeling stikstofdifferentiatie. Daarvoor moet u zich eerst aanmelden. De voorwaarden hiervan vindt u op onze website.

| Gewas | Klei 2023 | Noordelijk ¹⁰ , westelijk ¹¹ en centraal ¹² zand 2023 | Zuidelijk ¹³ zand 2023 | Löss ⁴ 2023 | Veen 2023 |
|--|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| Grasland (kg N per ha per jaar) | | | | | |
| Grasland met beweiden | 345 | 250 ¹⁴ | 250 ¹⁴ | 250 ¹⁴ | 265 |
| Grasland met volledig maaien ¹ | 385 | 320 ¹⁴ | 320 ¹⁴ | 320 ¹⁴ | 300 |
| Tijdelijk grasland² (kg N per ha per periode) | | | | | |
| van 1 januari tot minstens 15 april | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| van 1 januari tot minstens 15 mei ³ | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| van 1 januari tot minstens 15 augustus ³ | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| van 1 januari tot minstens 15 september ³ | 280 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| van 1 januari tot minstens 15 oktober ³ | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
| vanaf 15 april tot minstens 15 oktober | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
| vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober | 280 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| vanaf 15 september tot minstens 15 oktober | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| vanaf 15 oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Consumptieaardappelrassen hoge norm (zie tabel 2c) ¹⁵ | 275 | 260 | 208 | 204 | 270 |
| Consumptieaardappelrassen overig ¹⁵ | 250 | 235 | 188 | 184 | 245 |
| Consumptieaardappelrassen lage norm (zie tabel 2c) ¹⁵ | 225 | 210 | 168 | 164 | 220 |
| Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) ¹⁵ | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 |
| Pootaardappelrassen hoge norm (zie tabel 2d) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Pootaardappelrassen overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pootaardappelrassen lage norm (zie tabel 2d) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pootaardappelen, uitgroei teelt (loofvernietiging na 15 augustus) | 180 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Zetmeelaardappelen ¹⁵ | 240 | 230 | 184 | 184 | 230 |
| Suikerbieten | 150 | 145 | 116 | 116 | 145 |
| Cichorei | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Voederbieten | 165 | 165 | 132 | 132 | 165 |
| Wintertarwe ⁵ | 245 | 160 | 160 | 190 | 160 |
| Zomertarwe | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Wintergerst ⁵ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Zomergerst | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Triticale ⁵ | 160 | 150 | 120 | 120 | 150 |
| Winterrogge ⁵ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Haver ⁵ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mais, bedrijven met derogatie ^{6 16} | 160 | 140 | 112 | 112 | 150 |
| Mais, bedrijven zonder derogatie ^{6 16} | 185 | 140 | 112 | 112 | 150 |
| Luzerne, eerste jaar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Luzerne, volgende jaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gras voor industriële verwerking (inzaai in september en eerste jaar) | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gras voor industriële verwerking (inzaai voor 15 mei en volgende jaren) | 310 | 250 | 250 | 250 | 265 |
| Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 165 | 150 | 120 | 120 | 155 |
| Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Graszaad, rietzwenkgras | 140 | 130 | 104 | 104 | 135 |
| Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
| Graszaad, veldbeemd | 130 | 100 | 80 | 80 | 105 |

| Gewas | Klei 2023 | Noordelijk ¹⁰ , westelijk ¹¹ en centraal ¹² zand 2023 | Zuidelijk ¹³ zand 2023 | Löss ⁴ 2023 | Veen 2023 |
|---|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
| Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 |
| Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 35 | 35 | 28 | 28 | 35 |
| Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 115 | 105 | 84 | 84 | 110 |
| Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
| Graszaad, westerwolds | 110 | 100 | 80 | 80 | 105 |
| Graszaad, Italiaans | 130 | 120 | 96 | 96 | 125 |
| Graszaad, overig | 90 | 80 | 64 | 64 | 85 |
| Graszaad, overig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
| Graszoden | 340 | 340 | 272 | 272 | 340 |
| Ui, overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zaaiui | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Winterui, 2e jaars plantui | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 130 | 120 | 96 | 96 | 125 |
| Blauwmaanzaad | 110 | 100 | 80 | 80 | 105 |
| Karwij | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 90 | 80 | 64 | 64 | 85 |
| Koolzaad, winter | 205 | 190 | 152 | 152 | 195 |
| waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt) | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
| Koolzaad, zomer | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 |
| Vlas | 70 | 70 | 56 | 56 | 70 |
| Akkerbouwgewassen, overig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Bladgewassen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Spinazie, 1e teelt | 260 | 190 | 152 | 152 | 200 |
| Spinazie, volgteelt | 185 | 145 | 116 | 116 | 150 |
| Slasoorten, 1e teelt | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
| Slasoorten, volgteelt | 105 | 105 | 84 | 84 | 105 |
| Andijvie, 1e teelt | 180 | 170 | 136 | 136 | 170 |
| Andijvie, volgteelt | 90 | 90 | 72 | 72 | 90 |
| Selderij, bleek/groen | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Prei | 245 | 225 | 180 | 180 | 235 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 100 | 90 | 72 | 72 | 95 |
| Bladgewassen, overig, eenmalige oogst | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
| Bladgewassen, overig, meermalige oogst | 275 | 250 | 200 | 200 | 260 |
| Koolgewassen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Spruitkool | 290 | 265 | 212 | 212 | 275 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| Witte kool | 320 | 290 | 232 | 232 | 305 |
| Rode kool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
| Savooiekool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
| Spitskool | 285 | 260 | 208 | 208 | 270 |
| Bloemkool | 230 | 210 | 168 | 168 | 220 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
| Broccoli | 270 | 235 | 188 | 188 | 245 |
| Chinese kool | 180 | 155 | 124 | 124 | 160 |
| Boerenkool | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |

| Gewas | Klei 2023 | Noordelijk ¹⁰ , westelijk ¹¹ en centraal ¹² zand 2023 | Zuidelijk ¹³ zand 2023 | Löss ⁴ 2023 | Veen 2023 |
|--|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| Paksoi | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
| Raapstelen | 140 | 130 | 104 | 104 | 135 |
| Kruiden (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst | 150 | 140 | 112 | 112 | 145 |
| Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten | 275 | 250 | 200 | 200 | 260 |
| Kruiden, wortelgewassen | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Kruiden, zaadgewassen | 100 | 90 | 72 | 72 | 95 |
| Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Aardbei (wachtbed, vermeerdering) | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
| Aardbei (productie) | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
| waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) | 80 | 70 | 56 | 56 | 75 |
| Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) | 190 | 175 | 140 | 140 | 180 |
| Suikermaïs | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Stam/stokboon, vers | 120 | 110 | 88 | 88 | 115 |
| Landbouwstambonen, rijp zaad | 135 | 135 | 108 | 108 | 135 |
| Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| Tuinbonen, vers/peulen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Erwt, vers + rijp zaad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Peul | 90 | 85 | 68 | 68 | 85 |
| Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Asperge (excl. opkweek) | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 |
| Knolselderij | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Knolvenkel/venkel | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
| Koolraap | 170 | 155 | 124 | 124 | 160 |
| Koolrabi | 180 | 165 | 132 | 132 | 170 |
| Kroten/rode bieten | 185 | 170 | 136 | 136 | 175 |
| Winterpeen/waspeen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Bospeen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rabarber | 250 | 230 | 184 | 184 | 240 |
| Radijs | 80 | 80 | 64 | 64 | 80 |
| Schorseneer | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Witlof | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stengel/knol/wortelgewassen, overig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
| Groenbemesters⁷ (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Niet-vlinderbloemige groenbemesters | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Vlinderbloemige groenbemesters | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Graszaadstoppel ter vernietiging in najaar of vroege voorjaar | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Bloembollengewassen⁵ (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Acidanthera | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Anemone coronaria | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Fritillaria imperialis | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Hyacint | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Iris, grofbollig | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Iris, fijnbollig | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Krokus, grote gele | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |

| Gewas | Klei 2023 | Noordelijk ¹⁰ , westelijk ¹¹ en centraal ¹² zand 2023 | Zuidelijk ¹³ zand 2023 | Löss ⁴ 2023 | Veen 2023 |
|--|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| Krokus, overig | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Narcis | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Tulp | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Dahlia | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Gladiool, pitten | 260 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Gladiool, kralen | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Knolbegonia | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Lelie | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Zantedeschia | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bloembollengewassen, overig | 165 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar) | | | | | |
| Appel | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Blauwe bes | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Braam | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Framboos | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kers | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Peer | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Pruim | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Rode bes | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Wijnbouw | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zwarte bes | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Buitenbloemen (kg N per ha per teelt) | | | | | |
| Buitenbloemen hoge norm ⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Buitenbloemen overig | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tagetes | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar) | | | | | |
| Laanbomen: onderstammen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Laanbomen: spillen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Laanbomen: opzetters | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Sierheesters | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rozen (inclusief zaailingen, onderstammen) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bos- en Haagplantsoen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vaste planten | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Vruchtbomen: onderstammen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vruchtbomen: moerbomen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vruchtbomen, overig | 135 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Trek- en besheesters | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Snijgroen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ericaceae | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Buxus | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Bosbouw (kg N per ha per jaar) | | | | | |
| Snelgroeïende houtsoorten voor biomassaproductie | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vaste norm op bedrijfsniveau⁹ (kg N per ha per jaar) | | | | | |
| Vaste norm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

- 1 Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
- 2 De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
- 3 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voorzover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.
- 4 De gebruiksnormen die onder Löss zijn vermeld gelden alleen als het grond betreft die is ontstaan in eolisch materiaal en binnen 80 cm van het maaiveld voor meer dan de helft bestaat uit leem (fractie kleiner dan 50 µm). Voor de overige lössgronden gelden de gebruiksnormen die onder Zand zijn vermeld.
- 5 De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten.
- 6 De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters.
- 7 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. Voor groenbemesters op zand, löss en veen geldt: inzaaien voor 15 september en na 1 december ploegen. Op klei geldt: inzaaien voor 15 september en ploegen nadat de groenbemester aantoonbaar minimaal 8 weken wordt geteeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten op maïs. Teelt u de groenbemester na graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij en vlas? Dan mag u rekenen met de stikstofgebruiksnorm van 100%. Teelt u de groenbemester na een ander gewas? Dan mag u voor de groenbemester op bouwland op zand- en lössgrond maar 50% van de stikstofgebruiksnorm gebruiken.
- 8 Voor de volgende buitenbloemen geldt de hoge norm: Alchemilla mollis, Carthamus, Gypsophila paniculata, Lymonium, Lysimachia, Paeonia, Solidago, Veronica.
- 9 Deze vaste norm op bedrijfsniveau geldt als het gewogen gemiddelde van de hoeveelheid stikstof van alle op de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond geteelde gewassen of gewasgroepen uit tabel 1 op het bedrijf in dat kalenderjaar ten minste 100 kg N/ha en ten hoogste 110 kg N/ha bedraagt.
- 10 Zandgronden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
- 11 Zandgronden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
- 12 Zandgronden in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
- 13 Zandgronden in de provincies Limburg en Noord-Brabant
- 14 Vernieuwt u grasland op zand- en lössgrond in de periode van 1 juni t/m 31 augustus? Dan mag u 50 kilogram minder stikstof per hectare gebruiken.
- 15 Scheurt u grasland en teelt u direct daarna consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen (zetmeelaardappelen)? Dan mag u 65 kilogram minder stikstof gebruiken per hectare die u scheurt.
- 16 Scheurt u grasland en teelt u direct daarna maïs? Dan mag u 65 kilogram minder stikstof gebruiken per hectare die u scheurt.

Tabel 2a Stikstofdifferentiatie fritesaardappelen

| | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Accord | Challenger | Fresco | Lady Olympia | Ramos | Sinora |
| Agria | Daisy | Fontane | Marijke | Remarka | Ukama |
| Amora | Dolce Vita | Frieslander | Maritiema | Russet Burbank | Umatilla Russet |
| Anosta | Donald | Innovator | Markies | Sagitta | Van Gogh |
| Arcade | Fianna | Kennebec | Miranda | Santana | Victoria |
| Asterix | Felsina | Lady Amarilla | Miriam | Shepody | Zorba |
| Bintje | Florida | Lady Blanca | Premiere | Spirit | |

Fritesaardappelen op klei

Voor fritesaardappelen die worden geteeld op klei zijn er hogere stikstofgebruiksnormen. Die horen bij de regeling stikstofdifferentiatie. Daarvoor moet u zich eerst aanmelden. De voorwaarden hiervan vindt u op onze website op de pagina [Stikstofdifferentiatie](#).

Tabel 2b

Equivalente maatregel hogere opbrengsten

Als u gebruik maakt van deze equivalente maatregel, en u voldoet aan de voorwaarden, dan mag u een extra stikstofgebruiksnorm gebruiken. In deze tabel vindt u de toegestane verhoging per gewas, afhankelijk van de gemiddelde opbrengst van het totale areaal van het gewas in de 3 voorafgaande jaren.

U vindt alle voorwaarden op www.rvo.nl/equivalente-maatregelen.

| Gewas | Gemiddelde gewasopbrengst in ton per hectare in de 3 voorafgaande jaren | Toegestane verhoging stikstofgebruiksnorm in kilogram per hectare per jaar |
|-----------------------|---|--|
| Suikerbieten | 55 tot 65 | 5 |
| | 65 tot 75 | 15 |
| | 75 tot 85 | 30 |
| | 85 of meer | 35 |
| Consumptieaardappelen | 50 tot 55 | 5 |
| | 55 tot 60 | 15 |
| | 60 tot 65 | 25 |
| | 65 of meer | 30 |
| Wintertarwe | 9 tot 10 | 5 |
| | 10 tot 11 | 20 |
| | 11 of meer | 25 |
| Zomertarwe | 8 tot 9 | 10 |
| | 9 tot 10 | 15 |
| | 10 of meer | 20 |
| Wintergerst | 9 tot 10 | 10 |
| | 10 tot 11 | 15 |
| | 11 of meer | 20 |
| Zomergerst | 7 tot 8 | 0 |
| | 8 tot 9 | 15 |
| | 9 of meer | 15 |
| Pootaardappelen | 35 tot 40 | 5 |
| | 40 tot 45 | 15 |
| | 45 tot 51 | 25 |
| | 51 of meer | 30 |
| Zetmeelaardappelen | 45 of meer | 5 |
| Bloemkool | 26 tot 31 | 0 |
| | 31 tot 36 | 10 |
| | 36 of meer | 15 |
| Broccoli | 10 tot 12 | 0 |
| | 12 tot 14 | 5 |
| | 14 of meer | 10 |
| Slasoorten, 1e teelt | 41 tot 50 | 0 |
| | 50 tot 60 | 15 |
| | 60 of meer | 20 |

Tabel 2b Equivalente maatregel hogere opbrengsten

| Gewas, | Gemiddelde gewasopbrengst in ton per hectare in de 3 voorafgaande jaren | Toegestane verhoging stikstofgebruiksnorm in kilogram per hectare per jaar |
|---|---|--|
| Prei | 35 tot 40 | 0 |
| | 40 tot 45 | 15 |
| | 45 of meer | 20 |
| Spinazie, 1e teelt | 25 tot 30 | 5 |
| | 30 tot 35 | 10 |
| | 35 of meer | 25 |
| Andijvie, 1e teelt | 42,5 tot 47,5 | 10 |
| | 47,5 tot 52,5 | 20 |
| | 52,5 of meer | 25 |
| Winterpeen/waspeen | 85 tot 95 | 0 |
| | 95 tot 105 | 10 |
| | 105 of meer | 20 |
| Zaaiui | 55 tot 65 | 5 |
| | 65 tot 75 | 20 |
| | 75 of meer | 30 |
| Mais, bedrijven met en zonder derogatie | 40 tot 50 | 15 |
| | 50 tot 60 | 45 |
| | 60 of meer | 60 |

Tabel 2c Consumptieaardappelen hoge of lage norm

| Consumptieaardappelrassen hoge norm | | | Consumptieaardappelrassen lage norm | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Adora | Lady Blanca | Victoria | Agria | Eigenheimer | Mozart |
| Annabelle | Lady Olympia | VR 808 | Allure | El Paso | Producent |
| Bintje | Lady Rosetta | Zorba | Alpha | Futura | Remarka |
| Carlita | Liseta | | Aprilia | Gloria | Rodeo |
| Courage | Maritiema | | Asterix | Irene | Safari |
| Draga | Marlen | | Aziza | Maradonna | Saphire |
| Felsina | Miranda | | Ballys | Markies | Simply Red |
| Fontane | Ramos | | Baraka | Milva | Spirit |
| Innovator | Redstar | | Bartina | Minerva | Terra Gold |
| Inova | Sante | | Cesar | Mondial | Ukama |
| Jaerla | Satellite | | Dore | Morene | Vision |

Tabel 2d Pootaardappelen hoge of lage norm

Pootaardappelrassen hoge norm

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Adora | Inova | Prior |
| Agata | Jaerla | Rikea |
| Annabelle | Junior | Romano |
| Arinda | Lady Rosetta | Satellite |
| Berber | Lady Olympia | Sirco |
| Binella | Leyla | Sirtema |
| Climax | Linzer Delikatess | Sofia (AR 93-272) |
| Donald | Miriam | Tresor |
| Elisabeth | Orinana | Ukama |
| Fontane | Premiere | |
| Gloria | Primura | |

Pootaardappelrassen lage norm

| | | |
|------------|-----------|------------|
| Arcade | Kardal | Sifra |
| Astarte | Karnico | Simply Red |
| Asterix | Maradonna | Spirit |
| Baraka | Mondial | Van Gogh |
| Bartina | Morene | Vebesta |
| Diamant | Mozart | Vento |
| Dolce Vita | Picasso | Voyager |
| Elles | Remarka | |
| Elvira | Resonant | |
| Everest | Rodeo | |
| Florijn | Saphire | |

Tabel 3

Stikstofbehoefte gewassen en vanggewassen

Tabel 3a Stikstofbehoefte gewassen na scheuren van grasland

Als u grasland vernietigt moet u soms direct daarna een stikstofbehoefte gewas telen. Op onze website leest u wanneer dit zo is.

Stikstofbehoefte gewassen die u na het vernietigen van grasland mag telen

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Aardappelen | Courgette | Knolvenkel | Muscari | Spinazie | Wintergerst |
| Aardbei | Fritillaria imperialis | Koolraap | Narcis | Spitskool | Winterrogge |
| Acidanthera | Gladiool | Koolrabi | Paksoi | Spruitkool | Wintertarwe |
| Andijvie | Gras | Koolzaad | Plantui, 2e jaars | Stam- en stokbonen | Winterui |
| Anemone coronaria | Graszaad | Krokus | Pompoen | Suikerbiet | Witte kool |
| Augurk | Graszoden | Krotten | Prei | Suikermaïs | Zaaiui |
| Bleek- en groenselderij | Hyacint | Kruiden | Raapstelen | Tagetes ¹ | Zomertarwe |
| Bloemkool | Iris | Laanbomen: opzetters | Rabarber | Triticale | |
| Boerenkool | Japanse haver | Landbouwstambonen | Rode kool | Tulp | |
| Broccoli | Karwij | Lelie | Savooikool | Vaste planten | |
| Buitenbloemen | Knolbegonia | Maïs | Schorseneren | Venkel | |
| Chinese kool | Knolselderij | Meloen | Sla | Voederbiet | |

¹ Tagetes moet u op uiterlijk 16 juli telen.

Tabel 3b Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Als u maïs teelt op zand- en lössgrond moet u direct hierna een vanggewas telen. Het geteelde vanggewas mag u niet vóór 1 februari van het volgende jaar vernietigen.

Vanggewassen

Japanse haver

Bladkool

Bladrammenas

Gras

Triticale

Wintergerst

Winterrogge

Wintertarwe

Tabel 4

Diergebonden normen

Waarvoor gebruiken?

De normen in deze tabel gebruikt u om te berekenen hoeveel mest uw graasdieren en staldieren produceren. En hoeveel stikstof en fosfaat daarin zit. Ook gebruikt u de tabel voor de stikstofcorrectie voor staldieren.

Mestproductie per dier in m³

Na de berekening weet u of u genoeg opslagruimte heeft voor de mest van uw dieren. Het gaat hierbij om de ruimte die u nodig heeft voor het opslaan van de mest in de periode augustus tot en met februari in m³.

Normen voor melkkoeien

Voor de berekening van de mestproductie van melkkoeien gebruikt u Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe.

Mestproductie van graasdieren berekenen

U gebruikt bij de berekening van de mestproductie van een graasdier een forfait voor stikstof en een forfait voor fosfaat. Dit doet u in kilogrammen. U vermenigvuldigt voor het berekenen van de totale mestproductie het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft, met het forfait. Dit doet u voor al uw graasdiersoorten. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Vrijstelling voor administratie en registratie

Met de stikstofnormen kunt u berekenen of u vrijstelling kunt krijgen voor het bijhouden van een administratie en registratieverplichtingen. U heeft hiervoor vrijstelling als de stikstofproductie minder is dan 350 kilogram. Meer voorwaarden voor de vrijstelling vindt u op onze website.

Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De hoeveelheid stikstof voor stikstofcorrectie gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie. Dit is onderdeel van de stalbalans.

Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal? Dan gebruikt u niet de forfaits in deze tabel. U gebruikt dan de forfaits voor stikstof en fosfaat uit Tabel 4a Diergebonden normen biologisch. De forfaits hangen ook af van het stalsysteem dat u gebruikt.

Tabel 4 Diergebonden normen

| Diersoort en -categorie ¹ | Dier categorie nummer | Graasdier/ Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart | | Excretie per dier per jaar | | Stikstof- correctie kg/ dier/jaar ⁵ |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|---|--------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | m ³ ² | kg stikstof ³ | kg fosfaat ⁴ | | |
| Rund | 10 | | | | | | | |
| Melk- en kalfkoeien (Dit zijn koeien die in elk geval één keer hebben gekalfd en die worden gehouden voor de melkproductie voor menselijke consumptie of verwerking of voor de fokkerij van runderen voor de melkveehouderij. Ook koeien die zijn drooggezet om een kalf te krijgen of die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken) | 100 | G | drijfmest | Zie tabel 6 | Zie tabel 6 | Zie tabel 6 | | - |
| | | G | vaste mest | Zie tabel 6 | Zie tabel 6 | Zie tabel 6 | | |
| Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, waaronder alle kalveren van melk- en kalfkoeien van 0 tot ten minste 14 dagen. En vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij. | 101 | G | drijfmest | 4,4 | 32,3 | 9,6 | | - |
| | | G | vaste mest | 2,2 | 29,1 | 9,6 | | |
| Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij. En vrouwelijke opfokkalveren van 1 jaar en ouder voor de vleesveehouderij of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij | 102 | G | drijfmest | 9,5 | 66,9 | 21,9 | | - |
| | | G | vaste mest | 4,7 | 61,3 | 21,9 | | |
| Fokstieren (stieren van 1 jaar en ouder voor de fokkerij van runderen voor de melkvee- of vleesveehouderij) | 104 | G | drijfmest | 10 | 64,4 | 25,9 | | - |
| | | G | vaste mest | 6,3 | 51,2 | 25,9 | | |
| Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht) | 112 | S | alle | 1,6 | 11,3 | 5,4 | | 3 |
| Startkalveren voor rosévlees of roodvlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een bedrijf als rosévleeskalf dan wel roodvleesstier worden gehouden) | 115 | G | alle | 1,2 | 10,5 | 3,4 | | - |
| Rosévleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht) | 116 | G | alle | 3,3 | 26,3 | 9,4 | | - |
| Rosévleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht) | 117 | G | alle | 2,6 | 21,5 | 7,6 | | - |

| Diersoort en -categorie ¹ | Dier categorie nummer | Graasdier/ Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart | Excretie per dier per jaar | | Stikstof- correctie kg/ dier/jaar ⁵ |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | m ³ 2 | kg stikstof ³ | kg fosfaat ⁴ | |
| Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien) | 120 | G | drijfmest | 11,2 | 75,4 | 26,9 | - |
| | | G | vaste mest | 5,3 | 75,3 | 26,9 | - |
| Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op de dezelfde wijze worden gemest) | 122 | G | drijfmest | 4,2 | 28,2 | 9,7 | - |
| | | G | vaste mest | 2,2 | 25,6 | 9,7 | - |
| Schaap | | 55 | | | | | |
| Schapen voor de vlees- en melkproductie (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn en rammen) | 550 | G | alle | 0,6 | 9,9 | 3,3 | - |
| Vleeschapen tot ca. 4 maanden , gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren | 551 | G | alle | 0,1 | 0,9 | 0,3 | - |
| Opfokkoeien, weideschapen en vleeschapen van ca. 4 maanden en ouder | 552 | G | alle | 0,4 | 7,2 | 2,2 | - |
| Geit | | 60 | | | | | |
| Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken) | 600 | G | alle | 0,8 | 9,4 | 4,7 | - |
| Opfokgeiten en vleesgeiten tot ca. 4 maanden | 601 | G | alle | 0,1 | 0,6 | 0,3 | - |
| Opfokgeiten van ca. 4 maanden en ouder | 602 | G | alle | 0,5 | 4,7 | 2,6 | - |
| Paard | | 94 | | | | | |
| Pony's (dieren met een schofthoogte tot 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden) | 941 | G | alle | 4,4 | 27,3 | 13 | - |
| Paarden (dieren met een schofthoogte vanaf 1,56 meter en inclusief veulens tot 6 maanden) | 943 | G | alle | 7,8 | 58,8 | 28,6 | - |
| Ezel | | 96 | | | | | |
| Ezels (inclusief veulens tot 6 maanden) | 961 | G | alle | 3,6 | 16 | 7,3 | - |
| Middeneuropees edelhert | | 97 | | | | | |
| Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken | 971 | G | alle | 0,94 | 18,6 | 6,7 | - |
| Herten van 6 tot 12 maanden die worden gehouden om te worden geslacht | 973 | G | alle | 0,44 | 8,6 | 2,8 | - |
| Herten van 12 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht | 974 | G | alle | 1,09 | 21,4 | 6,4 | - |

| Diersoort en -categorie ¹ | Dier categorie nummer | Graasdier/ Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart | | Excretie per dier per jaar | | Stikstof- correctie kg/ dier/jaar ⁵ |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------|--|
| | | | | m ³ ² | kg stikstof ³ | kg fosfaat ⁴ | | |
| Damhert 98 | | | | | | | | |
| Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken | 981 | G | alle | 1,31 | 11,8 | 3,4 | - | - |
| Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht | 982 | G | alle | 0,81 | 9,7 | 2,4 | - | - |
| Waterbuffel 99 | | | | | | | | |
| Waterbuffelkoeien (alle waterbuffelkoeien die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken) | 991 | G | alle | 11,5 | 76,5 | 29,9 | - | - |
| Waterbuffeljongvee (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar) | 992 | G | alle | 4,3 | 28,7 | 10,1 | - | - |
| Varken 40 | | | | | | | | |
| Fokzeugen waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd). | 400 | S | vaste mest, emissiearm | 1,03 | 11,4 | - | 9,3 | |
| | | | vaste mest, overig | 1,03 | 11,4 | - | 9,3 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 1,4 | 14,5 | - | 6,2 | |
| | | | drijfmest, overig | 1,4 | 14,3 | - | 6,4 | |
| Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg). | 401 | S | vaste mest, emissiearm | 2 | 16,4 | - | 13,4 | |
| | | | vaste mest, overig | 2 | 16,4 | - | 13,4 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 2,5 | 20,9 | - | 8,9 | |
| | | | drijfmest, overig | 2,5 | 20,6 | - | 9,2 | |
| Opfokzeugen en -beren van ca. 25 kg tot geslachtsrijpheid | 404 | S | vaste mest, emissiearm | 0,81 | 7,9 | - | 6,5 | |
| | | | vaste mest, overig | 0,81 | 7,9 | - | 6,5 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 0,91 | 9,4 | - | 5 | |
| | | | drijfmest, overig | 0,91 | 8,7 | - | 5,7 | |
| Dekberen en zoekberen , geslachtsrijp | 406 | S | vaste mest, emissiearm | 1,3 | 12,7 | - | 10,4 | |
| | | | vaste mest, overig | 1,3 | 12,7 | - | 10,4 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 1,8 | 16,1 | - | 6,9 | |
| | | | drijfmest, overig | 1,8 | 15,9 | - | 7,1 | |

| Diersoort en -categorie ¹ | Dier categorie nummer | Graasdier/ Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart | | Excretie per dier per jaar | | Stikstofcorrectie kg/dier/jaar ⁵ |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|------|---|
| | | | | m ³ ² | kg stikstof ³ | kg fosfaat ⁴ | | |
| Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf | 407 | S | vaste mest, emissiearm | 0,25 | 1,2 | - | 1 | |
| | | | vaste mest, overig | 0,25 | 1,2 | - | 1 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 0,3 | 1,5 | - | 0,7 | |
| | | | drijfmest, overig | 0,3 | 1,5 | - | 0,7 | |
| Vleesvarkens | 411 | S | vaste mest, emissiearm | 0,71 | 6,4 | - | 5,2 | |
| | | | vaste mest, overig | 0,71 | 6,4 | - | 5,2 | |
| | | | drijfmest, emissiearm | 0,75 | 7,6 | - | 4 | |
| | | | drijfmest, overig | 0,75 | 7 | - | 4,6 | |
| Kip 30 | | | | | | | | |
| Leghennen en (groot)ouderdieren jonger dan 18 weken | 300 | S | volièrestal | 0,009 | 0,23 | - | 0,12 | |
| | | | overige mestbanden | 0,007 | 0,22 | - | 0,13 | |
| | | | overig | 0,007 | 0,2 | - | 0,15 | |
| Leghennen en (groot)ouderdieren 18 weken en ouder | 301 | S | volièrestal | 0,018 | 0,49 | - | 0,27 | |
| | | | overige mestbanden | 0,014 | 0,55 | - | 0,21 | |
| | | | overig | 0,015 | 0,46 | - | 0,3 | |
| (Groot)ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken | 310 | S | alle | 0,004 | 0,18 | - | 0,18 | |
| (Groot)ouderdieren van vleeskuikens 20 weken en ouder | 311 | S | emissiearm | 0,018 | 0,54 | - | 0,54 | |
| | | | overig | 0,018 | 0,44 | - | 0,64 | |
| Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht) | 312 | S | emissiearm | 0,011 | 0,29 | - | 0,13 | |
| | | | overig | 0,011 | 0,29 | - | 0,13 | |
| Kalkoen 20 | | | | | | | | |
| Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf) | 200 | S | alle | 0,011 | 0,24 | - | 0,21 | |
| Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf) | 201 | S | alle | 0,071 | 1,6 | - | 0,85 | |
| Kalkoenen ouderdieren (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder) | 202 | S | alle | 0,073 | 1,62 | - | 0,85 | |
| Vleeskalkoenen (kalkoenen die worden gehouden voor de slacht) | 210 | S | alle | 0,048 | 1,25 | - | 0,54 | |

| Diersoort en -categorie ¹ | Dier categorie nummer | Graasdier/ Staldier | Stalsysteem | Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart | | Excretie per dier per jaar | | Stikstof-correctie kg/ dier/jaar ⁵ |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|---|--------------------------|----------------------------|-------|---|
| | | | | m ³ ² | kg stikstof ³ | kg fosfaat ⁴ | | |
| Nerts | | | | | | | | |
| | 75 | | | | | | | |
| Fokteven (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie) | 751 | S | alle | 0,039 | 1,3 | - | 1 | |
| Konijn | | | | | | | | |
| | 90 | | | | | | | |
| Voedsters (alle vrouwelijke dieren die ten minste eenmaal gedekt zijn, met bijbehorende zogende jongen en opfokkonijnen) en fokrammen | 900 | S | alle | 0,126 | 1,7 | - | 1,3 | |
| Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie) | 901 | S | alle | 0,025 | 0,49 | - | 0,37 | |
| Peking eend | | | | | | | | |
| | 81 | | | | | | | |
| Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht) | 801 | S | alle | 0,028 | 0,46 | - | 0,28 | |
| Ouderdieren van vleeseenden in opfok (opfokperiode tot 20 weken) | 802 | S | alle | 0,037 | 0,48 | - | 0,29 | |
| Ouderdieren van vleeseenden (legperiode vanaf 20 weken) | 803 | S | alle | 0,045 | 0,87 | - | 0,54 | |
| Overige diersoorten | | | | | | | | |
| Rattus norvegicus (Bruine rat), Mus musculus (Tamme muis), Cavia porcellus (Cavia), Mesocricetus auratus (Goudhamster), Meriones unguiculatus (Gerbil)(vrouwelijke geslachtsrijpe dieren) | 15 | S | alle | 0,054 | 0,65 | - | 0,65 | |
| Struthio camelus (Struisvogel), Dromaius novaehollandiae (Emoe) en Rhea Americana (Nandoe) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren) | 25 | S | alle | 0,56 | 12,3 | - | 12,3 | |
| Anser cygnoides (Knobbelgans) en Anser anser (Grauwe gans) (alle geslachtsrijpe vrouwelijke ganzen) | 28 | S | alle | 0,086 | 3,2 | - | 3,2 | |
| Phasianus colchicus (Fazant), Perdix perdix (Patrijs) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren) | 35 | S | alle | 0,006 | 0,12 | - | 0,12 | |
| Columbia livia (Vleesduif), Numida meleagris (Helmparelhoen), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens) | 37 | S | emissiearm | 0,009 | 0,46 | - | 0,036 | |
| | | S | overig | 0,009 | 0,42 | - | 0,078 | |

1 Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie dienen de forfaits gehanteerd te worden van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.

2 Hoort bij artikel 36 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

3 Hoort bij de artikelen 43 en 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Met betrekking tot artikel 73 alleen relevant voor de graasdieren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de staldieren.

4 Hoort bij artikel 73 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Alleen relevant voor de graasdieren en daarmee niet van toepassing op diercategorieën die vallen onder de staldieren.

5 Hoort bij artikel 96 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Tabel 4a

Diergebonden normen biologisch

Waarvoor gebruiken?

De normen in deze tabel gebruikt u om te berekenen hoeveel mest uw biologisch gehouden dieren produceren. En hoeveel stikstof en fosfaat daarin zit.

Mestproductie per dier in m³

Na de berekening weet u of u genoeg opslagruimte heeft voor de mest van uw graasdieren en staldieren. Het gaat hierbij om de ruimte die u nodig heeft voor het opslaan van de mest in de periode augustus tot en met februari in m³.

Mestproductie van biologisch gehouden graasdieren berekenen

U gebruikt bij de berekening van de mestproductie van uw graasdieren een forfait voor stikstof en een forfait voor fosfaat. Dit doet u in kilogrammen. De fosfaatnormen vindt u in deel 1 en de stikstofnormen staat in deel 2 van deze tabel. U vermenigvuldigt voor het berekenen van de totale mestproductie het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft, met het forfait. Dit doet u voor al uw biologisch gehouden graasdieren, behalve melkkoeien. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Stikstofexcreties van biologisch gehouden staldieren

De stikstofexcreties van staldieren berekent u volgens de stalbalans. In deel 2 van deze tabel zijn wel excretieforfaits opgenomen als hulpmiddel om te bepalen of u gebruik kunt maken van onderstaande vrijstelling.

Vrijstelling voor administratie en registratie

Met de stikstofnormen kunt u berekenen of u gebruik kunt maken van de vrijstelling voor administratie en registratie. U kunt hieraan meedoen als de stikstofproductie minder is dan 350 kilogram.

Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

Geen biologisch bedrijf

Heeft u geen biologisch bedrijf dat geregistreerd is bij de Stichting Skal? Dan gebruikt u de forfaits voor stikstof en fosfaat uit tabel 4.

Tabel 4a Diergebonden normen biologisch

| | Dier- categorie- nummer | Graasdier / Staldier | Stal- systeem | Excretie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m ³ (als de diercategorie ontbreekt, dan gebruikt u tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg stikstof (Zie deel 2 of wanneer de diercategorie daarin ont- breekt tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg fosfaat | Stikstof- correctie per dier per jaar in kg |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|---|--|
| DEEL 1 | | | | | | | |
| Rund | 10 | | | | | | |
| Melk- en kalfkoeien (Dit zijn koeien die in elk geval één keer hebben gekalfd en die worden gehouden voor de melkproductie voor menselijke consumptie of verwerking of voor de fokkerij van runderen voor de melkveehouderij. Ook koeien die zijn drooggezet om een kalf te krijgen of die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken) | 100 | G | drijfmest | Zie tabel 6 | | Zie tabel 6 | - |
| | | G | vaste mest | Zie tabel 6 | | Zie tabel 6 | - |
| Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij , waaronder alle kalveren van melk- en kalfkoeien van 0 tot ten minste 14 dagen, en vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar dat later een kalf krijgt voor de vleesveehouderij of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij | 101 | G | drijfmest | 4,4 | | 9,6 | - |
| | | G | vaste mest | 2,2 | | 9,6 | - |
| Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij en vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder dat later een kalf krijgt voor de vleesveehouderij of dat bestemd is om een kalf te krijgen voor de vleesveehouderij | 102 | G | drijfmest | 9,5 | | 21,9 | - |
| | | G | vaste mest | 4,7 | | 21,9 | - |
| Fokstieren (stieren van 1 jaar en ouder voor de fokkerij van runderen voor de melkvee- of vleesveehouderij) | 104 | G | drijfmest | 10 | | 25,9 | - |
| | | G | vaste mest | 6,3 | | 25,9 | - |
| Startkalveren voor rosévlies of roodvlies (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een bedrijf als rosévlieskalf dan wel roodvliesstier worden gehouden) | 115 | G | alle | 1,2 | | 3,4 | - |
| Rosévlieskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht) | 116 | G | alle | 3,3 | | 9,4 | - |
| Rosévlieskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht) | 117 | G | alle | 2,6 | | 7,6 | - |

| | Dier- categorie- nummer | Graasdier / Staldier | Stal- systeem | Excretie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m ³ (als de diercategorie ontbreekt, dan gebruikt u tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg stikstof (Zie deel 2 of wanneer de diercategorie daarin ont- breekt tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg fosfaat | Stikstof- correctie per dier per jaar in kg |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|---|--|
| DEEL 1 | | | | | | | |
| Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien) | 120 | G | drijfmest | 11,2 | | 26,9 | - |
| | | | vaste mest | 5,3 | | 26,9 | - |
| Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op de dezelfde wijze worden gemest) | 122 | G | drijfmest | 4,2 | | 9,7 | - |
| | | | vaste mest | 2,2 | | 9,7 | - |
| Schaap | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | |
| Schapen voor de vlees- en melkproductie (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn en rammen) | 550 | G | alle | 0,6 | | 3,3 | - |
| | | | | | | | |
| Vleeschapen tot ca. 4 maanden , gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren | 551 | G | alle | 0,1 | | 0,3 | - |
| Opfokkoeien , weideschapen en vleeschapen van ca. 4 maanden en ouder | 552 | G | alle | 0,4 | | 2,2 | - |
| Geit | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken) | 600 | G | alle | 0,8 | | 4,4 | - |
| Opfokgeiten en vleesgeiten tot ca. 4 maanden | 601 | G | alle | 0,1 | | 0,3 | - |
| Opfokgeiten van ca. 4 maanden en ouder | 602 | G | alle | 0,5 | | 2,6 | - |
| Varken | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| Fokzeugen waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd) | 400 | S | vaste mest, emissiearm | 1,03 | | - | - |
| | | | vaste mest, overig | 1,03 | | - | - |
| | | | drijfmest, emissiearm | 1,4 | | - | - |
| | | | drijfmest, overig | 1,4 | | - | - |
| Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg. | 401 | S | vaste mest, emissiearm | 2 | | - | - |
| | | | vaste mest, overig | 2 | | - | - |
| | | | drijfmest, emissiearm | 2,5 | | - | - |
| | | | drijfmest, overig | 2,5 | | - | - |

| | Dier- categorie- nummer | Graasdier / Staldier | Stal- systeem | Excretie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m ³ (als de diercategorie ontbreekt, dan gebruikt u tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg stikstof (Zie deel 2 of wanneer de diercategorie daarin ont- breekt tabel 4) | Excretie per dier per jaar in kg fosfaat | Stikstof- correctie per dier per jaar in kg |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|---|--|
| DEEL 1 | | | | | | | |
| Opfokzeugen en -beren van ca. 25 kg tot geslachtsrijpheid | 404 | S | vaste mest, emissiearm | 0,81 | | - | - |
| | | S | vaste mest, overig | 0,81 | | - | - |
| | | S | drijfmest, emissiearm | 0,91 | | - | - |
| | | S | drijfmest, overig | 0,91 | | - | - |
| Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp | 406 | S | vaste mest, emissiearm | 1,3 | | - | - |
| | | S | vaste mest, overig | 1,3 | | - | - |
| | | S | drijfmest, emissiearm | 1,8 | | - | - |
| | | S | drijfmest, overig | 1,8 | | - | - |
| Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf | 407 | S | vaste mest, emissiearm | 0,25 | | - | - |
| | | S | vaste mest, overig | 0,25 | | - | - |
| | | S | drijfmest, emissiearm | 0,3 | | - | - |
| | | S | drijfmest, overig | 0,3 | | - | - |
| Vleesvarkens | 411 | S | vaste mest, emissiearm | 0,71 | | - | - |
| | | S | vaste mest, overig | 0,71 | | - | - |
| | | S | drijfmest, emissiearm | 0,75 | | - | - |
| | | S | drijfmest, overig | 0,75 | | - | - |
| Kip | 30 | | | | | | |
| Leghennen en (groot)ouerdieren jonger dan 18 weken | 300 | S | volièrestal | 0,009 | | - | - |
| | | S | overige mestbanden | 0,007 | | - | - |
| | | S | overig | 0,007 | | - | - |
| Leghennen en (groot)ouerdieren ouder dan 18 weken | 301 | S | volièrestal | 0,018 | | - | - |
| | | S | overige mestbanden | 0,014 | | - | - |
| | | S | overig | 0,015 | | - | - |
| Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht) | 312 | S | emissiearm | 0,011 | | | |
| | | S | overig | 0,011 | | | |

| Diersoorten | Onderscheiden categorieën binnen de diersoorten | Graasdier / Staldier | Excretie per dier per jaar in kg stikstof |
|--|---|-------------------------------|---|
| DEEL 2 | | | |
| Rundvee | Fok- en gebruiksvee | | |
| | Melk- en kalfkoeien gehouden in een stal met drijfmest | G | Zie tabel 6a |
| | Melk- en kalfkoeien gehouden in een stal met vaste mest | G | Zie tabel 6b |
| | Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar | G | 32,3 |
| | Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder | G | 66 |
| | Stieren voor de fokkerij jonger dan 1 jaar | G | 26,7 |
| | Stieren voor de fokkerij van 1 jaar en ouder | G | 51 |
| | Roodvleesproductie | | |
| | Weide- en zoogkoeien | G | 66,2 |
| | Vleesstierkalf tot een leeftijd van ca. 3 maanden | G | 6,6 |
| | Vleesstieren van ca. 3 maanden tot ca. 16 maanden oud | G | 27,2 |
| | Vleesstieren tot een leeftijd van ca. 16 maanden die op één bedrijf worden afgemest | G | 23,4 |
| | Overig vleesvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort tot de hierboven genoemde categorieën en jonger is dan 1 jaar | G | 26,4 |
| | Overig vleesvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort tot de hierboven genoemde categorieën van 1 jaar en ouder | G | 65,4 |
| | Varkens | Fokkerij/vermeerdering | |
| Fokzeugen waarvan de biggen ca. 6 weken na hun geboorte aan een ander bedrijf worden geleverd en fokzeugen die nog geen biggen hebben | | S | 12 |
| Fokzeugen waarvan de biggen worden gehouden tot ze een gewicht van ca. 25 kg hebben en fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden | | S | 15,3 |
| Opfokzeugen van ca. 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn en opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden | | S | 5,9 |
| Opfokzeugen van ca. 7 maanden tot de eerste dekking | | S | 9,1 |
| Opfokzeugen van ca. 25 kg tot de eerste dekking en opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg die worden aangehouden tot de eerste dekking | | S | 6,1 |
| Opfokberen van ca. 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn en opfokberen afkomstig van het eigen bedrijf van 25 kg totdat ze ca. 7 maanden oud zijn | | S | 5,5 |
| Dekberen van ca. 7 maanden en ouder en beren afkomstig van het eigen bedrijf van 7 maanden oud | | S | 11,7 |
| Gespeende biggen, aangeleverd op een leeftijd van ca. 6 weken, totdat ze een gewicht hebben van ca. 25 kg en gespeende biggen, aangeleverd op ca. 6 weken, die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij totdat ze een gewicht hebben van 25 kg | | S | 2 |

| Diersoorten | Onderscheiden categorieën binnen de diersoorten | Graasdier / Staldier | Excretie per dier per jaar in kg stikstof |
|------------------|---|----------------------|---|
| DEEL 2 | | | |
| | Mesterij | | |
| | Slachtzeugen | S | 12,8 |
| | Varkens die worden gemest van ca. 25 kg tot ca. 110 kg en biggen afkomstig van het eigen bedrijf vanaf 25 kg | S | 6,1 |
| Kippen | Legrassen | | |
| | Opfokhennen en -hanen jonger dan ca. 18 weken die worden afgeleverd op ca. 18 weken en opfokhennen en -hanen die op het eigen bedrijf worden gehouden tot 18 weken | S | 0,159 |
| | Hennen en hanen van legrassen van ca. 18 weken en ouder die zijn aangeleverd op ca. 18 weken en van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen van 18 weken en ouder | S | 0,371 |
| | Vleesrassen | | |
| | Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken en opfokhennen en -hanen die op het eigen bedrijf worden aangehouden tot 19 weken oud | S | 0,11 |
| | (Groot)ouderdieren van vleesrassen van ca. 19 weken en ouder en van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren van 19 weken en ouder | S | 0,411 |
| | Vleeskuikens | S | 0,332 |
| Kalkoenen | Voor broedeieren | | |
| | Hennen en hanen tot een leeftijd van ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf | S | 0,29 |
| | Hennen en hanen van ca. 6 tot ca. 30 weken oud, gehouden op een opfokbedrijf | S | 1,165 |
| | Hennen en hanen van ca. 30 weken en ouder | S | 1,513 |
| | Vleeskalkoenen | | |
| | Vleeskalkoenen, vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht | S | 0,884 |
| Schapen | Schapen voor de vlees- en melkproductie (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot ca. 4 maanden, voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn en rammen) | G | 9,9 |
| | Vleeschapen tot ca. 4 maanden, gehouden op bedrijven waar ze niet zijn geboren | G | 0,9 |
| | Opfokooien, weideschapen en vleeschapen van ca. 4 maanden en ouder | G | 7,2 |
| Geiten | Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en geslachtsrijpe bokken) | G | 8,9 |
| | Opfokgeiten en vleesgeiten tot ca. 4 maanden | G | 0,6 |
| | Opfokgeiten van ca. 4 maanden en ouder | G | 4,7 |
| Eenden | Ouderdieren van vleeseenden | S | 0,5 |
| | Vleeseenden | S | 0,39 |

| Diersoorten | Onderscheiden categorieën binnen de diersoorten | Graasdier / Staldier | Excretie per dier per jaar in kg stikstof |
|--------------------|---|----------------------|---|
| DEEL 2 | | | |
| Konijnen | Vrouwelijke konijnen die ten minste eenmaal zijn gedekt en niet-gespeende jongen | S | 1,24 |
| | Fokrammen, bestemd voor het fokken van vleeskonijnen | S | 0,75 |
| | Opfokkonijnen vanaf ca. 80 dagen oud tot de eerste dekking | S | 1,01 |
| | Vleeskonijnen vanaf het spenen tot ca. 80 dagen oud en opfokkonijnen tot 80 dagen oud | S | 0,4 |
| Parelhoenen | Vleesparelhoenders | S | 0,437 |

In deel 2 van deze tabel wordt verstaan onder:

- dekberen: jonge, nog niet dekrijpe beren en zoekberen;
- fokschapen: oaien die ten minste eenmaal hebben gelammerd;
- fokzeugen: varkens die ten minste eenmaal gedekt of geïnsemineerd zijn, waaronder guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen en zeugen waarvan de biggen gespeend zijn;
- hennen en hanen van legrassen: hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot)ouderdieren;
- melk- en kalfkoeien: koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, waaronder koeien die droog gezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken;
- melkgeiten: geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd;
- opfokberen: jonge, nog niet dekrijpe beren die worden aangehouden voor de fokkerij; - opfokhennen en -hanen van legrassen: opfokhennen en -hanen voor de vervanging van hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot)ouderdieren;
- opfokhennen en -hanen van vleesrassen: opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot)ouderdieren van vleesrassen;
- opfokkonijnen: jonge, nog niet dekrijpe konijnen die worden aangehouden voor de fokkerij;
- opfokzeugen: jonge zeugen die nooit gedekt of geïnsemineerd zijn die worden gehouden voor de fokkerij;
- slachtzeugen: zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest;
- stieren voor de fokkerij: stieren bestemd voor het fokken van melk- of vleesvee;
- voedsters: vrouwelijke konijnen die die ten minste eenmaal zijn gedekt;
- vleeskuikens: kuikens die voor de slacht worden afgeleverd;
- vrouwelijk jongvee: alle vrouwelijke dieren die nog nooit gekalfd hebben en die worden aangehouden voor de vervanging van de eigen veestapel of de veestapel van derden, waaronder drachtige dieren die niet eerder hebben gekalfd;
- weide- en zoogkoeien: koeien die niet meer worden gemolken, maar worden vetgeweid.

Tabel 5

Stikstof en fosfaat in dieren

Waarvoor gebruiken?

Deze tabel gebruikt u om te berekenen hoeveel stikstof en fosfaat u met de staldieren van uw bedrijf aan- en afvoert. Ook gebruikt u deze tabel om de begin- en eindvoorraad stikstof en fosfaat in de staldieren te berekenen.

Hoe gebruiken?

Hoeveel stikstof en fosfaat er in dieren zit is voor elke diersoort en de diercategorie anders. De forfaits ziet u in de tabel.

Lichaamsgewicht en forfaits

U moet de hoeveelheid stikstof en fosfaat berekenen met het lichaamsgewicht van het dier en het forfait 'per kg' dat daarbij hoort.

Zijn de dieren voor de slacht afgevoerd en is het geslacht gewicht bekend? Dan rekent u het geslacht gewicht om naar het levend gewicht (lichaamsgewicht). U rekent met het forfait 'per kg lichaamsgewicht'. Weet u het lichaamsgewicht niet? Alleen dan gebruikt u het forfait 'per dier'.

Uw begin- en eindvoorraad stikstof en fosfaat in staldieren

De berekening:

- Het levend gewicht (lichaamsgewicht) van de staldieren x het forfait.

Aan- en afvoer van fosfaat en stikstof in staldieren

De berekening:

- Het aantal aan- of afgevoerde dieren x het forfait.

| Diersoorten | Diercategorie-code | Per kg lichaam gewicht | | Per dier | |
|--|--------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| | | Kg stikstof | Kg fosfaat | Kg stikstof | Kg fosfaat |
| Rund | | | | | |
| Nuchtere kalveren | Ru 5 | 0,0294 | 0,0183 | 1,4 | 0,8 |
| Witveeskalveren | Ru 14 | 0,0302 | 0,0174 | 6,9 | 4,0 |
| Varken | | | | | |
| Pasgeboren biggen | Va 1 | 0,0187 | 0,0141 | 0,03 | 0,02 |
| Gespeende biggen, ongeveer 4 weken oud | Va 2 | 0,0244 | 0,0122 | 0,18 | 0,09 |
| Biggen van ongeveer 10 weken (ca. 25 kg) | Va 3 | 0,0248 | 0,0122 | 0,65 | 0,32 |
| Vleesvarkens | Va 4 | 0,0250 | 0,0123 | 2,85 | 1,40 |
| Fokzeugen | Va 5 | 0,0250 | 0,0123 | 5,13 | 2,51 |
| Opfokzeugen/beren van ongeveer 7 maanden | Va 6 | 0,0249 | 0,0132 | 3,11 | 1,65 |
| Fokberen ouder dan 7 maanden | Va 7 | 0,0250 | 0,0123 | 8,13 | 3,98 |
| Slachtzeugen | Va 8 | 0,0250 | 0,0123 | 5,13 | 2,51 |
| Kip | | | | | |
| Eendagskuikens | Ki 1 | 0,0258 | 0,0058 | 0,0010 | 0,0002 |
| Opfokhennen/hanen van ongeveer 18 weken, wit | Ki 2 | 0,0280 | 0,0126 | 0,036 | 0,016 |
| Opfokhennen/hanen van ongeveer 18 weken, bruin | Ki 3 | 0,0280 | 0,0126 | 0,043 | 0,019 |
| Hennen/hanen ouder dan 18 weken, wit | Ki 4 | 0,0280 | 0,0128 | 0,045 | 0,021 |
| Hennen/hanen ouder dan 18 weken, bruin | Ki 5 | 0,0280 | 0,0128 | 0,050 | 0,023 |
| Opfokhennen/hanen van ongeveer 20 weken | Ki 6 | 0,0334 | 0,0126 | 0,0735 | 0,0277 |
| Ouderieren vleesrassen ouder dan 20 weken | Ki 7 | 0,0292 | 0,0125 | 0,121 | 0,052 |
| Vleeskuikens | Ki 8 | 0,0283 | 0,0101 | 0,067 | 0,024 |

| Diersoorten | Diercategorie- code | Per kg lichaams gewicht | | Per dier | |
|---|------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | | Kg stikstof | Kg fosfaat | Kg stikstof | Kg fosfaat |
| Kalkoen | | | | | |
| Eendagskuikens | Ka 1 | 0,0300 | 0,0078 | 0,0017 | 0,0004 |
| Kalkoenenouderdieren van 7 maanden | Ka 2 | 0,0330 | 0,0117 | 0,46 | 0,16 |
| Kalkoenenouderdieren ouder dan 7 maanden | Ka 3 | 0,0330 | 0,0117 | 0,49 | 0,17 |
| Vleeskalkoenen, hennen | Ka 4 | 0,0330 | 0,0117 | 0,32 | 0,11 |
| Vleeskalkoenen, hanen | Ka 5 | 0,0330 | 0,0117 | 0,65 | 0,23 |
| Nerts | | | | | |
| Fokteven ouder dan 7 maanden | Ne 1 | 0,0279 | 0,0137 | 0,033 | 0,016 |
| Reuen ouder dan 7 maanden | Ne 2 | 0,0279 | 0,0137 | 0,081 | 0,040 |
| Pups | Ne 3 | 0,0279 | 0,0137 | 0,016 | 0,008 |
| Konijn | | | | | |
| Jonge konijnen | Ko 1 | 0,0300 | 0,0124 | 0,021 | 0,009 |
| Voedsters en fokrammen | Ko 2 | 0,0302 | 0,0119 | 0,121 | 0,048 |
| Vleeskonijnen | Ko 3 | 0,0282 | 0,0119 | 0,075 | 0,032 |
| Opfokkonijnen | Ko 4 | 0,0295 | 0,0116 | 0,075 | 0,032 |
| Bruine rat | | | | | |
| Alle ratten | Ra 1 | 0,0289 | 0,0137 | 0,0101 | 0,0048 |
| Tamme muis | | | | | |
| Alle muizen | Mu 1 | 0,0289 | 0,0137 | 0,0016 | 0,0008 |
| Cavia | | | | | |
| Alle cavia's | Ca 1 | 0,0289 | 0,0137 | 0,0275 | 0,0131 |
| Goudhamster | | | | | |
| Alle goudhamsters | Go 1 | 0,0289 | 0,0137 | 0,0087 | 0,0041 |
| Gerbil | | | | | |
| Alle gerbils | Ge 1 | 0,0289 | 0,0137 | 0,0029 | 0,0014 |
| Pekingeeend | | | | | |
| Eendagskuikens | Pe 1 | 0,0280 | 0,0068 | 0,0016 | 0,0004 |
| Vleeseenden 3200 g | Pe 3 | 0,0295 | 0,0116 | 0,0994 | 0,0371 |
| Ouderdieren van vleeseenden (tot 18 weken) 3125 g | Pe 4 | 0,0295 | 0,0116 | 0,0922 | 0,0363 |
| Ouderdieren van vleeseenden (ouder dan 18 weken) 3400 g | Pe 5 | 0,0331 | 0,0180 | 0,1125 | 0,0612 |
| Struisvogel | | | | | |
| Alle struisvogels | St 1 | 0,0330 | 0,0117 | 3,63 | 1,28 |
| Emoe | | | | | |
| Alle emoës | Em 1 | 0,0330 | 0,0117 | 1,65 | 0,58 |
| Nandoe | | | | | |
| Alle nandoes | Na 1 | 0,0330 | 0,0117 | 1,09 | 0,39 |

| Diersoorten | Diercategorie- code | Per kg lichaams gewicht | | Per dier | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | | Kg stikstof | Kg fosfaat | Kg stikstof | Kg fosfaat |
| Knobbelgans | | | | | |
| Alle knobbelganzen | Kn 1 | 0,0259 | 0,0121 | 0,13 | 0,06 |
| Grauwe gans | | | | | |
| Alle grauwe ganzen | Gr 1 | 0,0259 | 0,0121 | 0,13 | 0,06 |
| Helmparelhoen | | | | | |
| Eendagskuikens | He 1 | 0,0248 | 0,0076 | 0,0007 | 0,0002 |
| Vleesparelhoenders | He 2 | 0,0357 | 0,0126 | 0,0718 | 0,0253 |
| Fazant | | | | | |
| Alle fazanten | Fa 1 | 0,0357 | 0,0126 | 0,054 | 0,019 |
| Patrijs | | | | | |
| Alle patrijzen | Pa 1 | 0,0357 | 0,0126 | 0,014 | 0,005 |
| Vleesduif | | | | | |
| Alle duiven | VI 1 | 0,0357 | 0,0126 | 0,006 | 0,002 |

Tabel 6

Stikstof en fosfaat per melkkoe

Waarvoor gebruiken?

De normen in deze tabel gebruikt u om te berekenen hoeveel mest uw melkkoeien produceren. En hoeveel stikstof en fosfaat daarin zit. U maakt onderscheid tussen drijfmest en vaste mest.

Na de berekening weet u of u genoeg opslagruimte heeft voor de mest van uw melkkoeien. Het gaat hierbij om de ruimte die u nodig heeft voor het opslaan van de mest in de periode augustus tot en met februari in m³.

Vrijstelling voor administratie en registratie

Met de stikstofnormen kunt u ook berekenen of u vrijstelling kunt krijgen voor het bijhouden van een administratie en registratieverplichtingen. U heeft hiervoor vrijstelling als de stikstofproductie minder is dan 350 kilogram.

Hoe te gebruiken?

De hoeveelheid stikstof hangt af van hoeveel melk een koe in een jaar produceert (in kilogram) en van het ureumgehalte (in milligram voor elke 100 gram melk). Ook de hoeveelheid fosfaat hangt af van de melkproductie. Om de totale mestproductie van melkkoeien te berekenen, vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal melkkoeien (in een jaar) op uw bedrijf met het bijbehorende forfait.

Melkproductie en ureumgehalte

De gemiddelde melkproductie van een melkkoe berekent u zo: u bepaalt hoeveel koemelk er in een jaar op uw bedrijf is geproduceerd. Die hoeveelheid deelt u door het gemiddeld aantal melkkoeien in dat jaar op uw bedrijf.

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Als u als melkveehouder wilt afwijken van de forfaits in deze tabel, dan kunt u gebruikmaken van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX). Op onze website vindt u de actuele versie van de BEX.

Tabel 6a Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m³ mest per zeven maanden).

| Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Ureumgehalte in mg/100 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fosfaat- excretie (kg) | Mestproductie (m ³ per 7 mnd) | | |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---|------|------|
| | <14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | 40 | >40 |
| < 5.624 | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,5 | 94,0 | 95,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,5 | 122,0 | 32,4 | 12,1 |
| 5.625 - 5.874 | 80,5 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 94,0 | 95,5 | 97,0 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 127,0 | 34,0 | 12,6 |
| 5.875 - 6.124 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | 87,5 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,5 | 129,0 | 34,8 | 12,9 |
| 6.125 - 6.374 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 90,0 | 91,5 | 93,0 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 128,0 | 129,5 | 131,0 | 35,5 | 13,1 |
| 6.375 - 6.624 | 87,0 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 95,5 | 97,0 | 98,5 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 36,2 | 13,4 |
| 6.625 - 6.874 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 124,0 | 125,5 | 127,0 | 129,0 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,5 | 36,9 | 13,6 |
| 6.875 - 7.124 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 136,0 | 137,5 | 37,7 | 13,9 |
| 7.125 - 7.374 | 93,5 | 95,0 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 38,4 | 14,1 |
| 7.375 - 7.624 | 95,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,5 | 127,0 | 128,5 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,0 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 142,0 | 39,1 | 14,4 |
| 7.625 - 7.874 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 126,0 | 127,5 | 129,0 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,5 | 139,0 | 140,5 | 142,5 | 144,0 | 39,8 | 14,6 |
| 7.875 - 8.124 | 100,0 | 101,5 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,5 | 128,0 | 129,5 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 138,0 | 139,5 | 141,0 | 143,0 | 144,5 | 146,0 | 40,6 | 14,9 |
| 8.125 - 8.374 | 102,0 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 127,0 | 128,5 | 130,0 | 132,0 | 133,5 | 135,0 | 136,5 | 138,5 | 140,0 | 141,5 | 143,5 | 145,0 | 146,5 | 148,5 | 41,3 | 15,1 |
| 8.375 - 8.624 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,0 | 139,0 | 140,5 | 142,0 | 144,0 | 145,5 | 147,0 | 149,0 | 150,5 | 42,0 | 15,4 |
| 8.625 - 8.874 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 128,0 | 129,5 | 131,0 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 137,5 | 139,5 | 141,0 | 142,5 | 144,5 | 146,0 | 147,5 | 149,5 | 151,0 | 152,5 | 42,7 | 15,6 |
| 8.875 - 9.124 | 108,5 | 110,0 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,5 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 140,0 | 141,5 | 143,0 | 145,0 | 146,5 | 148,0 | 150,0 | 151,5 | 153,0 | 154,5 | 43,5 | 15,9 |
| 9.125 - 9.374 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,0 | 129,0 | 130,5 | 132,0 | 134,0 | 135,5 | 137,0 | 138,5 | 140,5 | 142,0 | 143,5 | 145,5 | 147,0 | 148,5 | 150,5 | 152,0 | 153,5 | 155,0 | 157,0 | 44,2 | 16,1 |
| 9.375 - 9.624 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,5 | 136,0 | 137,5 | 139,0 | 141,0 | 142,5 | 144,0 | 146,0 | 147,5 | 149,0 | 151,0 | 152,5 | 154,0 | 155,5 | 157,5 | 159,0 | 44,9 | 16,4 |
| 9.625 - 9.874 | 115,0 | 116,5 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 141,5 | 143,0 | 144,5 | 146,5 | 148,0 | 149,5 | 151,5 | 153,0 | 154,5 | 156,0 | 158,0 | 159,5 | 161,0 | 45,6 | 16,6 |
| 9.875 - 10.124 | 117,0 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 124,0 | 125,5 | 127,0 | 128,5 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,5 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 142,0 | 143,5 | 145,0 | 147,0 | 148,5 | 150,0 | 152,0 | 153,5 | 155,0 | 156,5 | 158,5 | 160,0 | 161,5 | 163,5 | 46,4 | 16,9 |
| 10.125 - 10.374 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,0 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 136,0 | 137,5 | 139,0 | 141,0 | 142,5 | 144,0 | 145,5 | 147,5 | 149,0 | 150,5 | 152,5 | 154,0 | 155,5 | 157,0 | 159,0 | 160,5 | 162,0 | 164,0 | 165,5 | 47,1 | 17,1 |
| 10.375 - 10.624 | 121,5 | 123,0 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 129,5 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 141,5 | 143,0 | 144,5 | 146,0 | 148,0 | 149,5 | 151,0 | 153,0 | 154,5 | 156,0 | 157,5 | 159,5 | 161,0 | 162,5 | 164,5 | 166,0 | 167,5 | 47,8 | 17,4 |
| > 10.624 | 126,0 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,5 | 139,0 | 140,5 | 142,5 | 144,0 | 145,5 | 147,0 | 149,0 | 150,5 | 152,0 | 154,0 | 155,5 | 157,0 | 158,5 | 160,5 | 162,0 | 163,5 | 165,5 | 167,0 | 168,5 | 170,5 | 172,0 | 49,3 | 17,9 |

Tabel 6b Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m³ mest per zeven maanden).

| Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Ureumgehalte in mg/100 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fosfaat- excretie (kg) | Mestproductie (m ³ per 7 mnd) | | |
|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---|------|-----|
| | <14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | 40 | >40 |
| < 5.624 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 72,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 32,4 | 6,2 |
| 5.625 - 5.874 | 69,5 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 77,5 | 79,0 | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 85,0 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 34,0 | 6,5 |
| 5.875 - 6.124 | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 93,5 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 110,5 | 34,8 | 6,6 |
| 6.125 - 6.374 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 90,0 | 91,5 | 92,5 | 94,0 | 95,5 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 35,5 | 6,7 |
| 6.375 - 6.624 | 75,0 | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 84,5 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 36,2 | 6,8 |
| 6.625 - 6.874 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,5 | 91,0 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,0 | 36,9 | 7,0 |
| 6.875 - 7.124 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 90,0 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 95,5 | 97,0 | 98,5 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 37,7 | 7,1 |
| 7.125 - 7.374 | 80,5 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,0 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 98,5 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 38,4 | 7,2 |
| 7.375 - 7.624 | 82,0 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,0 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 39,1 | 7,3 |
| 7.625 - 7.874 | 84,0 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 95,5 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 122,0 | 123,5 | 39,8 | 7,5 |
| 7.875 - 8.124 | 86,0 | 87,5 | 88,5 | 90,0 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 40,6 | 7,6 |
| 8.125 - 8.374 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 41,3 | 7,7 |
| 8.375 - 8.624 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 127,5 | 129,0 | 42,0 | 7,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 7

Stikstof en fosfaat in eieren

Waarvoor gebruiken?

Met deze tabel berekent u de hoeveelheid stikstof en fosfaat in eieren die u aan- en afvoert. U bepaalt met deze tabel ook de hoeveelheid stikstof en fosfaat die aan het begin en het einde van het jaar op voorraad is.

Hoe gebruiken?

Voor de berekening vermenigvuldigt u het aantal aan- en afgevoerde eieren (in kilogram) met de norm die hierbij hoort. Voor de berekening van de begin- en eindvoorraad vermenigvuldigt u het aantal eieren (in kilogram) in voorraad met de norm die daarbij hoort.

| | Kg stikstof per kg ei | Kg fosfaat per kg ei |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Consumptie-eieren van kippen | 0,0185 | 0,0039 |
| Broedeieren van kippen | 0,0193 | 0,0044 |
| Eieren van kalkoenen | 0,0194 | 0,0046 |
| Eieren van eenden | 0,0195 | 0,0045 |
| Eieren van andere dieren | 0,0190 | 0,0040 |

Tabel 8

Opbrengst en stikstof en fosfaat in diervoer

Waarvoor gebruiken?

Deze tabel gebruikt u voor het bepalen van de gebruikte hoeveelheid voer voor staldieren die u heeft gebruikt. Daarbij gaat het om het voer dat u op uw eigen bedrijf produceert. U berekent ook hoeveel stikstof en fosfaat daarin zat. Er zijn forfaits voor ruwvoer en enkelvoudig diervoer. En er zijn forfaits voor de totale opbrengst per hectare en voor droge stof.

Hoe te gebruiken?

U vermenigvuldigt per gewas (het voer voor de dieren) het aantal hectare van dat gewas met de stikstof- en fosfaatgehalten uit de tabel. Voor de bepaling van de hoeveelheid stikstof of fosfaat van de begin- of eindvoorraad vermenigvuldigt u per gewas het gewicht met de forfaitaire gehalten van vers gewicht of droge stof gewicht.

Product als co-materiaal

Gebruikt u 1 van de producten als co-materiaal in een co-vergistinginstallatie? Dan kunt u voor de forfaitaire gehalten gebruikmaken van de forfaits van het betreffende product. Lees meer over co-vergisting op onze website.

| Gewas | Opbrengst (ton ds/ha) | Opbrengst (ton product/ha) | Stikstofgehalte (kg stikstof/ ton ds) | Fosfaatgehalte (kg fosfaat/ ton ds) | Stikstofgehalte (kg stikstof/ton vers product) | Fosfaatgehalte (kg fosfaat/ton vers product) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| Snijmaïs | 16,1 | 44,6 | 11,3 | 4,5 | 4,0 | 1,6 |
| Maïskolvenschroot | 7,8 | 14,0 | 14,4 | 5,7 | 7,6 | 3,0 |
| Corncobmix (100% spil) | 7,9 | 15,0 | 15,5 | 6,9 | 8,1 | 3,6 |
| Corncobmix (25% spil) | 7,9 | 12,4 | 15,0 | 6,9 | 9,5 | 4,3 |
| Korrelmaïs | 7,9 | 9,1 | 12,2 | 5,5 | 10,5 | 4,8 |
| Gehele plant silage | 8,8 | 10,5 | 17,6 | 6,9 | 5,7 | 2,2 |
| Tarwe | 7,6 | 8,8 | 20,9 | 7,5 | 17,9 | 6,4 |
| Erwten | 5,5 | 6,5 | 37,5 | 9,8 | 32,5 | 8,5 |
| Gerst | 5,9 | 6,8 | 18,5 | 8,2 | 13,9 | 7,1 |
| Aardappelen (vers) | 9,9 | 49,1 | 16,8 | 4,6 | 3,4 | 0,9 |
| Aardappelen (kuil) | ¹ | ¹ | 10,4 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
| Appelen | ¹ | ¹ | 4,2 | 1,6 | 0,7 | 0,3 |
| Graanstro (rogge) | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 2,3 | 3,9 | 1,9 |
| Graanstro (tarwe) | 3,5 | 4,1 | 6,6 | 2,1 | 5,8 | 1,8 |
| Grashooi | ¹ | ¹ | 21,1 | 6,2 | 17,8 | 5,2 |
| Graskuil | ¹ | ¹ | 27,9 | 9,4 | 12,4 | 4,2 |
| Graszaadstro | ¹ | ¹ | 9,9 | 4,4 | 8,5 | 3,7 |
| Rogge | 3,3 | 3,8 | 15,5 | 8,2 | 16,0 | 7,1 |
| Uien | 6,0 | 51,0 | 21,6 | 6,9 | 2,5 | 0,8 |
| Voederbieten | 15,5 | 100,0 | 12,5 | 4,6 | 1,7 | 0,6 |
| Witlofwortelen | ² | ² | 8,2 | 5,7 | 1,2 | 0,9 |
| Kaaswei | | | 37,0 | 24,4 | 1,3 | 0,9 |

ds = droge stof

ha = hectare

- Opbrengst is sterk afhankelijk van teeltmethode en tijdstip van oogsten en het betreft vaak een deel van de totale opbrengst van het jaar.
De jaaropbrengst is afhankelijk van de stikstofgift
- Altijd aanvoer van andere bedrijven, waarbij geen relatie met oppervlakte te maken is.

Tabel 9

Werkzame stikstof landbouwgrond

Waarvoor gebruiken?

Met de werkingscoëfficiënt berekent u hoeveel werkzame stikstof in de mest zit die u op uw bedrijf gebruikt. Dit doet u alleen voor de stikstofgebruiksnorm. Voor de gebruiksnorm dierlijke mest rekent u met alle stikstof die in de dierlijke mest zit.

Hoe gebruiken?

De werkzame stikstof in de mest berekent u zo:
De hoeveelheid gebruikte mest x het passende percentage (werkingscoëfficiënt).

Dit doet u voor alle organische mestsoorten die u op uw bedrijf heeft gebruikt. Er zijn verschillende werkingscoëfficiënten. Deze zijn afhankelijk van:

- de mestsoort;
- de herkomst;
- het type bedrijf (met of zonder beweiding);
- het tijdstip van gebruik.

Voor kunstmest rekent u met een werkingscoëfficiënt van 100%.

Beweiden of volledig maaien?

U bepaalt in 1x voor uw hele bedrijf of uw grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien.

Voorwaarden voor grasland met volledig maaien:

- U weidt alleen jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar.
- Het aantal stuks jongvee in de wei is niet groter dan het aantal ouderdieren op uw bedrijf.
- Dieren die u voor de hobby houdt mag u weiden. U telt ze niet mee.

Mengsels van mest

Heeft u een mengsel van mestsoorten? Dan rekent u met de werkingscoëfficiënt van het type mest (in het mengsel) met de hoogste werkingscoëfficiënt. Zit er in het mengsel een mestsoort die niet in deze tabel staat? Reken dan met een werkingscoëfficiënt van 100%.

Kunt u laten zien wat het aandeel stikstof is van alle mestsoorten van het mengsel? Dan mag u de werkingscoëfficiënt ook apart berekenen voor elke gebruikte mestsoort.

Digestaat

Voor digestaat uit de covergistingsinstallatie geldt de werkingscoëfficiënt van de mest die bij het vergisten is gebruikt. Lees meer over covergisting op onze website.

Mestscheiding

Na mestscheiding ontstaat een dunne en een dikke fractie. Voor dunne fractie staat een werkingscoëfficiënt in deze tabel. De dikke fractie na mestscheiding zien we als vaste mest. De werkingscoëfficiënt van vaste mest staat in de tabel.

Tabel 9 Werkzame stikstof landbouwgrond

| Soort en herkomst meststof ¹ | Toepassing ¹ | Werkingscoëfficiënt in procenten |
|--|---|----------------------------------|
| Drijfmest en dunne fractie | | |
| Drijfmest van graasdieren op het eigen bedrijf geproduceerd | Op bedrijf met beweiding ² | 45 |
| | Op bedrijf zonder beweiding ³ | 60 |
| Drijfmest van graasdieren aangevoerd | | 60 |
| Drijfmest van varkens | Op klei en veen | 60 |
| | Op zand en löss | 80 |
| Drijfmest van overige diersoorten | | 60 |
| Dunne fractie na mestbewerking en gier | | 80 |
| Vaste mest | | |
| Vaste mest van graasdieren op het eigen bedrijf geproduceerd | Op bouwland op klei en veen, van 1 september t/m 31 januari | 30 |
| | Overige toepassingen op bedrijf met beweiding ² | 45 |
| | Overige toepassingen op bedrijf zonder beweiding ³ | 60 |
| Vaste mest van graasdieren aangevoerd | Op bouwland op klei en veen, van 1 september t/m 31 januari | 30 |
| | Overige toepassingen | 40 |
| Vaste mest van varkens, pluimvee en nertsen | | 55 |
| Vaste mest van overige diersoorten | Op bouwland op klei en veen, van 1 september t/m 31 januari | 30 |
| | Overige toepassingen | 40 |
| Overig | | |
| Compost | | 10 |
| Champost | | 25 |
| Zuiveringsslib | | 40 |
| Overige organische meststoffen | | 50 |
| Mengsels van meststoffen ⁴ | Voor mengsels geldt de werkingscoëfficiënt van de meststof met de hoogste werkingscoëfficiënt die het mengsel bevat | |

1 Zonder nadere vermelding geldt de werkingscoëfficiënt voor alle grondsoorten, ongeacht herkomst en voor het hele jaar, tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is verboden.

2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag u alleen toepassen, als uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor beweide grasland toepast.

3 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding past u toe, als u op uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor grasland zonder beweiding toepast.
Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.

4 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Tabel 10

Varkens en pluimvee omrekenen naar eenheden

Waarvoor gebruiken?

U rekent met deze normen uit hoeveel varkensenheden (VE) of pluimvee-eenheden (PE) u heeft. U weet na de berekening hoeveel productierechten u nodig heeft om de dieren te mogen houden.

Hoe gebruiken?

U rekent het aantal dieren dat u in een jaar houdt, om naar VE en PE. Dit doet u voor elke diercategorie. Het gemiddeld aantal dieren dat u in een jaar heeft, vermenigvuldigt u met de omrekenfactor van de diercategorie.

U heeft geen productierechten nodig wanneer u:

- minder dan 250 pluimvee-eenheden houdt;
- minder dan 3 varkens- eenheden houdt

Vleeskalkoenen

U bepaalt het gemiddeld aantal vleeskalkoenen met de datum van de afvoer van de hennen. Dit geldt ook als u de hanen enkele weken langer op het bedrijf heeft.

| Diercategorie-nummer | Diersoort | Omrekenings-factor |
|----------------------|---|--------------------|
| 400 | Fokzeugen inclusief biggen jonger dan 6 weken (ten minste eenmaal gedekt of geïnsemineerd: guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de biggen aan een ander bedrijf worden geleverd ca. 6 weken na hun geboorte) | 1,97 ve |
| 401 | Fokzeugen inclusief biggen biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste eenmaal gedekt of geïnsemineerd: guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg (ook fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden) | 2,74 ve |
| 402 | Opfokzeugen jonger dan 7 maanden (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden, ook aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder en opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden) | 0,96 ve |
| 403 | Opfokzeugen van 7 maanden en ouder (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste dekking, ook opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking) | 1,59 ve |
| 404 | Opfokzeugen van een gewicht van 25 kg tot de eerste dekking (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot de eerste dekking. Opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden worden afgeleverd, maar worden aangehouden tot de eerste dekking; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf die worden aangehouden van exact 25 kg tot de eerste dekking) | 1,11 ve |
| 405 | Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg) | 1,09 ve |
| 406 | Dekberen (dekrijpe beren - ook zoekberen - van ca. 7 maanden en ouder; ook aangeleverde beren van iets jonger dan 7 maanden; beren afkomstig van het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact 7 maanden) | 1,86 ve |

| Diercategorie-nummer | Diersoort | Omrekenings-factor |
|----------------------|---|--------------------|
| 407 | Biggen (gespeende biggen die op ca. 6 weken zijn aangeleverd, die worden afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken aangeleverde biggen die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij, tot exact 25 kg) | 0,36 ve |
| 410 | Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest) | 1,59 ve |
| 411 | Vleesvarkens (varkens die doorgaans worden gemest vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg; ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25 kg) | 1 ve |
| 300 | Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken (opfokhennen en -hanen voor de vervanging van hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot) ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 18 weken meegeteld) | 0,4 pe |
| 301 | Hennen en hanen van legrassen, ca. 18 weken en ouder (hennen en hanen - inclusief (groot)ouderdieren - die zijn aangeleverd op ca. 18 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen - inclusief (groot)ouderdieren -, vanaf exact 18 weken) | 1 pe |
| 310 | Opfokhennen en -hanen van vleesrassen (opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot)ouderdieren van vleesrassen, die worden afgeleverd op ca. 19 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 19 weken meegeteld) | 0,5 pe |
| 311 | Ouderdieren van vleesrassen (ouderdieren - inclusief grootouderdieren - van vleesrassen, die zijn aangeleverd op ca. 19 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren, vanaf exact 19 weken) | 1,48 pe |
| 312 | Vleeskuikens (kuikens die voor de slacht worden afgeleverd) | 0,48 pe |
| 200 | Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren ca. 0 tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf) | 0,52 pe |
| 201 | Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf) | 2,94 pe |
| 202 | Kalkoenen ouderdieren (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder) | 4 pe |
| 210 | Vleeskalkoenen (vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht) | 1,58 pe |

Tabel 11

Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest

Waarvoor gebruiken?

De forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton mest, onderscheiden naar diersoort, diercategorie en mestsoort, gebruikt u voor de bepaling van de hoeveelheid fosfaat en stikstof in (dierlijke) mest die in een jaar forfaitair (dus zonder te wegen, bemonsteren en analyseren) van uw bedrijf is afgevoerd of aangevoerd. Voor een aantal mestcodes is geen forfait vastgesteld.

Hoe te gebruiken?

Voor de berekening vermenigvuldigt u de hoeveelheid aan- en afgevoerde (dierlijke) mest met de bijbehorende norm. Voert u de mest van uw bedrijf af zonder wegen, bemonsteren en analyseren? Op onze website vindt u de voorwaarden voor het forfaitair afvoeren van (dierlijke) mest.

| Diersoort | Omschrijving | Mestcode | Kg stikstof per ton | Kg fosfaat per ton |
|-------------------------------|---|----------|---------------------|--------------------|
| Rundvee | Vaste mest | 10 | 6,4 | 3,2 |
| | Filtraat na mestscheiding | 11 | 4,0 | 1,3 |
| | Gier | 12 | 4,0 | 0,2 |
| | Koek na mestscheiding | 13 | 16,9 | 9,8 |
| | Drijfmest behalve van vleeskalveren | 14 | 4,0 | 1,5 |
| | Bewerkte kalvergier | 17 | 4,2 | 5,0 |
| | Vleeskalveren, witvlees | 18 | 3,2 | 1,2 |
| | Vleeskalveren, rosevlees | 19 | 5,5 | 2,2 |
| Kalkoenen | Mest, alle systemen | 23 | 30,1 | 22,9 |
| Kippen | Drijfmest | 30 | 9,9 | 6,2 |
| | Deeppitstal, kanalenstal | 31 | 24,3 | 22,1 |
| | Mestband | 32 | 26,0 | 20,9 |
| | Mestband + nadroog | 33 | 32,6 | 26,3 |
| | Geheel of gedeeltelijk strooiselstal (incl. voliërestal/scharrelstal) | 35 | 26,8 | 24,9 |
| Vleeskuikens en parelhoenders | Mest, alle systemen | 39 | 31,1 | 15,4 |
| Varkens | Vaste mest | 40 | 8,1 | 8,0 |
| | Filtraat na mestscheiding | 41 | 6,8 | 1,6 |
| | Gier | 42 | 2,0 | 0,9 |
| | Koek na mestscheiding | 43 | 25,7 | 21,4 |
| | Drijfmest fokzeugen, incl. biggen, opfokzeugen/-beren, dekberen | 46 | 3,8 | 2,4 |
| | Drijfmest vleesvarkens | 50 | 6,4 | 3,8 |
| Schapen | Mest, alle systemen | 56 | 8,5 | 4,7 |
| Geiten | Drijfmest | 60 | 4,8 | 2,5 |
| | Vaste mest | 61 | 9,1 | 4,8 |
| Nertsen | Vaste mest | 75 | 27,7 | 45,7 |
| | Drijfmest | 76 | 7,9 | 3,1 |
| Eenden | Vaste mest | 80 | 9,7 | 9,4 |
| | Drijfmest | 81 | 5,8 | 3,8 |
| Konijnen | Vaste mest | 90 | 11,3 | 11,7 |
| | Drijfmest met percentage droge stof < 2,5% | 91 | 0,81 | 0,14 |
| | Drijfmest | 92 | 4,4 | 3,0 |
| Paarden | Vaste mest | 25 | 4,8 | 2,5 |

| Diersoort | Omschrijving | Mestcode | Kg stikstof per ton | Kg fosfaat per ton |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Ezels | Vaste mest | 26 | 5,0 | 3,0 |
| Pony 's | Vaste mest | 27 | 4,7 | 3,2 |
| Herten | Vaste mest | 95 | 7,1 | 5,3 |
| Waterbuffels | Mest, alle systemen | 96 | 4,1 | 2,1 |
| Knobbelgans | Vaste mest | 97 | 8,9 | 8,1 |
| Grauwe gans | Vaste mest | 98 | 8,9 | 8,1 |
| Fazanten en patrijzen | Vaste mest | 99 | 32,6 | 17,7 |
| Struisvogels, emoës en nandoes | Vaste mest | 100 | 23,1 | 18,7 |
| Vleesduif | Vaste mest | 101 | 23,1 | 18,7 |
| Bruine rat | Vaste mest | 102 | 11,9 | 11,7 |
| Tamme muis | Vaste mest | 103 | 11,9 | 11,7 |
| Cavia | Vaste mest | 104 | 11,9 | 11,7 |
| Goudhamster | Vaste mest | 105 | 11,9 | 11,7 |
| Gerbil | Vaste mest | 106 | 11,9 | 11,7 |
| | Fase 1 substraat | 107 | 5,5 | 3,1 |
| | Fase 2 substraat ³ | 108 | | |
| | Fase 3 substraat ¹ | 109 | 8,0 | 4,4 |
| | Champost ² | 110 | 7,0 | 3,9 |
| | Compost ³ | 111 | | |
| | Zeer schone compost ³ | 112 | | |
| | Zuiveringsslib vloeibaar ³ | 113 | | |
| | Zuiveringsslib steekvast ³ | 114 | | |
| | Kunstmest ³ | 115 | | |
| | Overige mestsoorten ³ | 116 | | |
| | Gescheiden champost ⁴ | 117 | 7,1 | 4,1 |

- 1 Fase 3 substraat is het product dat van het compostbedrijf wordt vervoerd naar de champignonkwekerij.
- 2 Champost is het product dat van de champignonkwekerij wordt afgevoerd.
- 3 Voor deze mestcodes zijn geen forfaits vastgesteld.
- 4 Gescheiden champost: de doorgroeide dekaarde wordt gescheiden van het champignonsubstraat. De met mycelium doorgroeide dekaarde met champignonresten die overblijft na scheiding kan worden afgevoerd als overige organische meststof.

Tabel 11b

Opmerkingscodes op het rVDM

Waarvoor gebruiken?

Op het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) moet u een opmerkingscode invullen als er sprake is van een bepaalde situatie. Het is mogelijk dat u meerdere opmerkingscodes moet invullen. In deze tabel vindt u bij elke opmerkingscode een omschrijving van de situatie.

| Omschrijving | Opmerkingscode |
|--|----------------|
| Over de grens | |
| Export naar België | 11 |
| Export naar Duitsland | 12 |
| Verklaring eigen gebruik op grensperceel in België of Duitsland | 13 |
| Export naar Frankrijk | 14 |
| Export naar overige landen | 19 |
| Import uit België | 21 |
| Import uit Duitsland | 22 |
| Erkenning als grensoverschrijdend veeteeltbedrijf | 23 |
| Import uit Frankrijk | 24 |
| Import uit overige landen | 29 |
| Bepaling van hoeveelheid | |
| Levering aan particulier | 31 |
| Boer-boer | 32 |
| Afvoer naar uit gebruik gegeven grond | 33 |
| Afvoer naar natuurterrein | 34 |
| Afvoer van kleine bedrijven (<350 kg N en < 3 ha) | 35 |
| Aanvoer naar kleine bedrijven (<350 kg N en < 3 ha) | 39 |
| Konijnengier (drogestof <2,5%) | 36 |
| Keten paardenmest – substraat – champost | 37 |
| Vervoer per schip of per trein | 45 |
| Gesplitst vervoer van vaste mest | 46 |
| Afvoer naar tuincentrum of hovenier | 47 |
| Afvoer uit co-vergistinginstallaties | 93 |
| Afgekeurd digestaat | 96 |
| Bijzonderheden transport | |
| Geen wegtransport (bijv. pijpleiding KGBI) | 42 |
| Wegtransport KGBI | 44 |
| Bijzonderheden bemonstering | |
| Mestmonster verloren gegaan | 50 |
| Partijbemonstering | 58 |
| Mestverwerkingsplicht | |
| Als elke voorgeschreven melding aan rVDM heeft plaatsgevonden geldt het als mestverwerkingsovereenkomst in het kader van de verwerkingsplicht. Afvoer direct naar verwerker of export. | 61 |
| Uitzonderingen mestverwerkingsplicht | |
| Regionale afzet | 71 |
| Afvoer naar champignonsubstraatbereider | 72 |
| Huisvestingssysteem strorijke mest | 73 |

Tabel 11c

Opmerkingscodes op VZC

Waarvoor gebruiken?

Bij vraag 4 van het Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) moet u een opmerkingscode invullen als er sprake is van een bepaalde situatie. In deze tabel vindt u bij elke opmerkingscode een omschrijving van de situatie.

| Omschrijving | Opmerkingscode op VZC |
|--|-----------------------|
| Grensoverschrijdend | |
| Export naar België | 11 |
| Export naar Duitsland | 12 |
| Export naar Frankrijk | 14 |
| Export naar overige landen | 19 |
| Import uit België | 21 |
| Import uit Duitsland | 22 |
| Import uit Frankrijk | 24 |
| Import uit overige landen | 29 |
| Hoeveelheidsbepaling | |
| Levering aan particulier | 31 |
| Afvoer naar natuurterrein | 34 |
| Afvoer naar tuincentrum of hovenier | 47 |
| Onderling gemengd vloeibaar zuiveringsslib | 59 |
| Bijzonderheden transport | |
| Levering eenmalige compostgift | 60 |